



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ANEXA

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID

Nr. RO/2018/0223/MRA/IE/BPA 70513

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 10.04.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piată în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : UK
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : **IE/BPA 70513**

II. Data emiterii autorizatiei: 05.11.2018; data emiterii anexei : 12.04.2019, rescris in data de 27.06.2019

III. Data expirării autorizatiei: 14.01.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: PROKUM PELET

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PelGar International Limited, France


Adresa: 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: PelGar International Limited, France

Adresa: 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

- I. Prezentul document este parte integranta din Certificatul nr. **RO/2018/0223/MRA/IE/BPA 70513**
- II. Prezentul certificat a fost modificat. Pentru eliminarea stocurilor ce decurg din anexa certificatului emis in data de 12.04.2019 se aplica prevederile Art. 52 din Regulamentul UE nr. 528/2012.

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2018/0223/MRA/ IE/BPA 70513

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 12.09.2018, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: UK
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **IE/BPA 70513**

II. Data emiterii autorizației: 05.11.2018, rescris în data de 27.06.2019, 23.09.2019

III. Data expirării autorizației: 14.03.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: PROKUM PELET

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PelGar International Limited, France

Adresa : 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: PelGar International Limited, France

Adresa : 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: PelGar International Limited

Adresa : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de producție : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

2. Agrochema 67502 Konesin Czech Republic

3. Promedivet SRL 545500 SOVATAm str. Lunga, nr. 46/G, jud. Mures, Romania

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PelGar International Limited

Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

Loc de producție: **PelGar International Limited, Prazska 54, 280 02, Kolin, Republica Ceha**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VI.

TIPUL DE PRODUS : TP 14-Rodenticide

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Publicul general, profesioniști, profesioniști instruiți

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeală gata de utilizare: Peleți (RB)
Organismele țintă (după caz, inclusiv stadiul de dezvoltare al acestora)
Speciile țintă sunt șobolanul maroniu (*Rattus norvegicus*) și șoarecele de casă (*Mus musculus*).
Este utilizat în eradicarea rozătoarelor din interiorul și din exteriorul, în jurul clădirilor (clădiri urbane și agricole).

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanța activă

Denumirea comună	Brodifacoum
Denumirea IUPAC	3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]tetralin-1-yl]-2-hydroxy-chromen-4-one
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Conținut de substanță activă	0,0025%

2) Substanța inactivă/nonactivă – nu se specifică

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice

Simboluri	GHS08 Atentie
Fraze de pericol (H)	H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudenta (P)	P102 – A nu se lasa la indemana copiilor. P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile. P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcăminte. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitați dispersarea în mediu. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P404 – A se depozita într-un recipient închis. P405 – A se depozita sub cheie.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



	P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotararilor municipale
Pictograme	

XI. AMBALAREA

Pentru utilizatori : public general (non-profesional), interiorul clădirilor pentru administrare la soareci

Cantitate maximă de momeală per pachet 50g

-15, 20, 25, 30 sau 50g hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / Al / PE pungi în PE / PP

Ambalaj interior: PE, plicuri, pungi AL/PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, căni sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g.

-15, 20, 25, 30 sau 50g în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri de hârtie / Al / PE, ambele în cutie de carton cu căptușeală PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: carton cu căptușeală PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g

-15, 20, 25, 30 sau 50g hârtie / PE sau AL / PE sau pungi de hârtie / Al / PE, ambele în ambalaje din carton / carton cu inserți din fibră de sticlă.

Ambalaje interioare: hârtie /AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: carton/sau carton fibrolemnos 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

Momeală liberă de până la 20g ambalată în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în multiplii în ambalaj de carton la exterior.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: carton exterior 10g, 15g, 20g (ambalat în multiplii de 1/2/4)

Maxim 50g permis

Momeală liberă de până la 20g ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP, stații unice pentru momeală sau multifuncționale, stații rezistente la acțiuni externe, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu un capac de carton.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton

mașon din carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu un capac din carton 10g, 15g, 20g (ambalat în multiplii de 1/2/4)

Maxim 50g permis.

Pentru utilizatori public general (non-profesioniști) interior/ sobolani

Cantitate maximă de momeală per pachet 150g

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / Al / PE pungi în PE / PP ambalaje (tuburi, găleți, pungi)

Ambalaje interioare: hârtie / PE, Pungi Al / PE




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, căni sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g
-15, 20, 25, 30, 50 sau 60 de hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE, ambele în cutie cu căptușeală PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton cu căptușeală PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri de hârtie / AI / PE, ambele în ambalaje din carton /AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: carton din fibre carton / carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

Momeală liberă de până la 60g ambalată în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură ambalat în multipli în cutii din carton .

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: carton exterior 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate în multipli de 2/4/8/12/15)

Maxim permis 150g

Momeală liberă de până la 60 g ambalată în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP, stații unice pentru momeală sau multifuncționale, stații rezistente la acțiuni externe, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu un capac de carton.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată termic cu un capac din carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate în multipli de 1, 2 sau 4).

Maxim permis 150g

Utilizatori: public general (non-profesioniști) interior/exterior și în jurul (sobolani)

Cantitate maximă de momeală pe pachet 150g

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / AI / PE pungi în PE / PP ambalaje (tuburi, găleți, pungi)

Ambalaje interioare: hârtie / PE, Pungi AI / PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, căni sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60 de hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE, ambele în cutie cu căptușeală PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton cu căptușeală PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri de hârtie / AI / PE, ambele în ambalaje din carton /AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: carton din fibre carton / carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



Momeală liberă de până la 60g ambalată în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură ambalat în multiplii în cutii din carton .

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: carton exterior 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate în multipli de 2/4/8/12/15)

Maxim permis 150g

Momeală liberă de până la 60 g ambalată în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP, stații unice pentru momeală sau multifuncționale, stații rezistente la acțiuni externe, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu un capac de carton.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată termic cu un capac din carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate în multiplii de 1, 2 sau 4).

Maxim permis 150g

Utilizatori profesioniști (interior) soareci

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg.

Saci hârtie multi-strat cu capacitate de până la 25 kg cu barieră de umiditate PE sau multistrat de hârtie cu sac interior PE separat sau PP cu sac interior țesut PE sau sac țesut PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: hârtie, PP, PE sac, sac PP 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / AI / PE pungi în PE / PP

Ambalaje interioare: hârtie / PE, Pungi AI / PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13g, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g de hârtie / PE sau AL / PE sau pungi de hârtie / AI / PE, ambele în cutie de carton PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19 kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri de hârtie / AI / PE, ambele în ambalaje din carton /AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE, pungi.

Ambalaje exterioare: carton cu inserții din fibră sticlă / cutie din carton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19 kg, 20kg.

Momeală liberă în pachete PE / PP (cade, cuve sau pungi)

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (cane, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19 kg, 20kg.

Momeală liberă în cutie cu căptușeală PE

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg,




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19 kg, 20kg.

Pachetul este limitat la pungi separate ambalate, cu o pungă maximă de 10 kg.

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald ambalat în multiplii ambalat în ambalaj interior de carton.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură

Ambalaje exterioare: carton Multiplii:

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în stații de momeală HDPE sau PP toate pachetele ambalate în multiplii 1, 2 sau 4 într-un ambalaj din carton sau din blister sau dintr-un manșon din carton sau într-o pungă sigilată la cald sau polietilenă cu un capac din carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton, manșon sau pungă sigilată cu căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu un capac din carton Multipli

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

Utilizatori profesioniști (interior) șobolani

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg.

Saci hârtie multi-strat cu capacitate de până la 25 kg cu barieră de umiditate PE sau multistrat de hârtie cu sac interior PE separat sau PP cu sac interior țesut PE sau sac țesut PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: N / A




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Ambalaje exterioare: hârtie, PP / PE sac, sac PP 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg,
-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g sau 200g în hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / AI / PE pungi în PE /
PP ambalaje interioare: PE sau plicuri din hârtie / AI / PE
Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,
7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.
-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 g sau 200 g de hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE
ambele în cutie de carton PE.
Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE
Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg,
11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.
-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g sau 200g hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE, ambele
în ambalaje din carton /carton cu inserție de fibră de sticlă.
Ambalaj interior: AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE
Ambalaje exterioare: cutie cu inserție de fibre de sticlă / carton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,
7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.
Momeală liberă în pachete PE / PP (cade, cuve sau pungi)
Ambalaj interior: N / A
Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (cane, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7
kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg
Momeală liberă în cutie cu căptușeală PE
Ambalaj interior: N / A
Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg,
11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg
Pachetul este limitat la pungi separate ambalate, cu o pungă maximă de 10 kg.
Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)
ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în multipli în cutii din carton.
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cal
Ambalaje exterioare: carton
Multipli
10g -250
15g - 250
20g - 125, 144
25g - 120, 144
30g - 96, 120, 144
40g - 72, 96, 120, 144
50g - 60, 72, 96, 120, 144
60g - 48, 60, 72, 96, 120
Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)
ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP în stații unice
pentru momeală sau stații multifuncționale, rezistente la acțiunea factorilor externi, toate ambalate
în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată
prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII- COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald
Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton/ manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Multiplu

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

Utilizatori profesioniști în exterior și în jurul clădirilor pentru utilizare împotriva soareciilor și / sau sobolanilor

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg.

Saci hârtie multi-strat cu capacitate de până la 25 kg cu barieră de umiditate PE sau multistrat de hârtie cu sac interior PE separat sau PP cu sac interior țesut PE sau sac țesut PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: hârtie, PP, PE sac, sac PP 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g, în hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / AI / PE pungi în PE / PP

ambalaje interioare: PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, sau 60g în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE ambele în cutie de carton PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50 sau 60g, în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE, ambele în ambalaje din carton / carton cu inserție de fibră de sticlă.

Ambalaj interior: AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie cu inserție de fibre de sticlă / carton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

Momeală liberă în pachete PE / PP (cade, cuve sau pungi)

Ambalaj interior: N / A



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII- COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Ambalaje exterioare: pachete PE/ PP (cane, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă în cutie cu căptușeală PE

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Pachetul este limitat la pungi separate ambalate, cu o pungă maximă de 10 kg.

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în multiplii în cutii din carton.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cal

Ambalaje exterioare: carton

Multiplii

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP în stații unice pentru momeală sau stații multifuncționale, rezistente la acțiunea factorilor externi, toate ambalate în multiplii de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton/ manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Multiplu

10g - 250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

Utilizatori profesioniști instruiți șoareci și șobolani interior

Dimensiunea minimă a ambalajului este de 2,5 kg.

Saci hârtie multi-strat cu capacitate de până la 25 kg cu barieră de umiditate PE sau multistrat de hârtie cu sac interior PE separat sau PP cu sac interior țesut PE sau sac țesut PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: hârtie, PP, PE sac, sac PP 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g, în hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / Al / PE pungi în PE / PP ambalaje interioare: PE sau plicuri din hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,

7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE

ambele în cutie de carton PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton căptușită PP de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g, în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE,

ambele în ambalaje din carton / carton cu inserție de fibră de sticlă.

Ambalaj interior: AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: cutie cu inserție de fibre de sticlă / carton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

Momeală liberă în pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi)

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,

7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă în cutie cu căptușeală PE

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: cutie de carton cu căptușeală PP de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Pachetul este limitat la pungi separate ambalate, cu o pungă maximă de 10 kg.

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în multiplii în cutii din carton.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cal

Ambalaje exterioare: carton

Multiplii

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP în stații unice pentru momeală sau stații multifuncționale, rezistente la acțiunea factorilor externi, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton/ manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Multiplu

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

Utilizatori profesioniști instruiți pentru șoareci și șobolani în exterior și în jurul clădirilor

Dimensiunea minimă pe pachet: 2,5 Kg

Saci hârtie multi-strat cu capacitate de până la 25 kg cu barieră de umiditate PE sau multistrat de hârtie cu sac interior PE separat sau PP cu sac interior țesut PE sau sac țesut PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: hârtie, PP, PE sac, sac PP 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50,60, 100 sau 200g, în hârtie / PE sau AL / PE sau hârtie / Al / PE pungi în PE / PP

ambalaje interioare: hârtie/PE, Al/PE sau plicuri din hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, 60,100 sau 200g în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE ambele în cutie de carton căptușită PE.

Ambalaj interior: plicuri de hârtie / PE, AL / PE sau hârtie / Al / PE

Ambalaje exterioare: cutie de carton cu căptușeală PE de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

-15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g, în hârtie / PE sau AL / PE sau plicuri din hârtie / Al / PE,



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



ambele în ambalaje din carton /carton cu inserție de fibră de sticlă.

Ambalaj interior: AL / PE sau plicuri din hârtie / AI / PE

Ambalaje exterioare: cutie cu inserție de fibre de sticlă / carton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg.

Momeală liberă în pachete PE / PP (tuburi, găleți sau pungii)

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: pachete PE / PP (cane, găleți sau pungii) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg , 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă în cutie cu căptușeală PE

Ambalaj interior: N / A

Ambalaje exterioare: cutie de carton de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18kg, 19kg, 20kg

Pachetul este limitat la pungii separate ambalate, cu o pungă maximă de 10 kg.

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la căldură, ambalat în multiplii în cutii din carton.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: carton

Multiplii

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă de până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (numai la șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald, ambalat în folii HDPE sau PP în stații unice pentru momeală sau stații multifuncționale, rezistente la acțiunea factorilor externi, toate ambalate în multiplii de 1, 2 sau 4 într-un ambalaj exterior din carton sau blister sau carton sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Ambalaje interioare: tăvi de momeală cu un capac etanșat la cald

Ambalaje exterioare: HDPE sau PP stație de momeală ambalate într-un carton exterior sau blister sau carton/ manșon sau pungă sigilată prin căldură sau polietilenă sigilată prin căldură cu capac de carton la exterior.

Multiplu

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



50g - 60, 72, 96, 120, 144
60g - 48, 60, 72, 96, 120
80g - 32, 48, 60, 72, 96
90g - 32, 48, 60, 72, 96
100g - 32, 48, 60, 72, 96
120g - 24, 32, 48, 60, 72
200g - 16, 24, 32, 48, 60
240g - 16, 24, 32, 48, 60

XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE

Asupra sănătății umane: Asupra sănătății umane

Efecte adverse directe

Acest produs este un rodenticid anticoagulant de tip cumarinic, conține o substanță activă anticoagulantă (brodifacoum), derivată din cumarină care inhibă vitamina K și blochează formarea protrombinei. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea echimoze și sânge în scaun sau urină.

Produsul este considerat periculos pentru sanatatea umana in concordanta cu Directiva 67/578/CEE si cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), produsul poate provoca deteriorari ale organelor (sânge) in cazul unei expuneri repetate sau prelungite, operatorii trebuie sa fie constienti ca substanta activa poate provoca probleme grave de sanatate in urma expunerii prelungite. Produsul conține un ingredient care poate dăuna fătului, evitându-se contactul în timpul sarcinii/alăptării.

Efecte adverse indirecte. Efecte iritante principale

Corodarea/iritarea pielii : Nu are efecte iritante

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu are efecte iritante

Sensibilizarea căilor respiratorii și a pielii : Nu este sensibilizant

Asupra sănătății animalelor nevizate : Vertebratele care nu sunt specii țintă pot fi expuse la substanța activă, fie direct prin ingestia de momeală rodenticidă sau a resturilor de momeală (intoxicare primară), fie indirect, prin înghițirea carcaselor de rozătoare specia țintă care conțin reziduuri ale substanței active (intoxicare secundară).

Este necesară monitorizarea activității protrombinice imediat după ingestie și în zilele următoare. În caz de activitate protrombinică redusă, se va administra vitamina K.


Contraindicații: nu se vor administra anticoagulante. Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor: Cele mai întâlnite semne de otrăvire sunt hemoragiile (hemoragii la nivelul mucoaselor, organelor și parenchimului), sânge în urină.

Asupra mediului: Sol: Trebuie evitată cat mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea patrunderii în sol, ținând cont de proprietățile PBT și vP ale brodifacoumului. Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor.

Apa : Substanța activă îndeplinește criteriile de PBT și vP; este persistentă în apă, cu tendințe de bioacumulare în organisme și foarte toxică .

Aer: Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

Organismele acvatice : Produsul prezintă un risc acceptabil pentru organismele acvatice .



Alte organisme netinta : Produsul nu prezinta risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru. Fara efecte semnificative asupra proceselor de respiratie/nitrificare din sol.

XIII. ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia/Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
Rodenticida	Metoda de referință: Struhar, V. (2004 Octombrie) Studiu in laborator Studiu de palatabilitate/ eficacitate: 10 animale (5 femele și 5 masculi) testate. Aclimatizare: 6 zile Expunere: 4 zile Perioada de observare: max. 20 zile.	Soareci de casă (<i>Mus musculus</i>)	Produs vechi de 2 ani, 0,005 m/m %	Consum de momeală: 43,6 % din totalul de alimente. Consum mediu de produs testat/probă de referință: 4,1 g/ 5,3 g. Mortalitate 100 %, la 7-9 zile de la expunere. Eficacitate 100 %.
	Metoda de referință: Struhar, V. (2004 August) Studiu in laborator Studiu de palatabilitate/ eficacitate: 10 animale (5 femele și 5 masculi) testate. Aclimatizare: 6 zile Expunere: 4 zile Perioada de observare: max. 20 zile.	Șoareci de casă (<i>Mus musculus</i>)	Produs proaspăt, 0,005 m/m %	Consum de momeală: 51,7 % din totalul de alimente. Consum mediu de produs testat/probă de referință: 6,1 g/ 5,6 g. Mortalitate 100 %, la 6-10 zile de la expunere. Eficacitate 100 %.
Rodenticida	Metoda de referință: Struhar, V. (2004 Octombrie) Studiu in laborator Studiu de palatabilitate/ eficacitate: 10 animale (5 femele și 5 masculi) testate. Aclimatizare: 6 zile Expunere: 4 zile Perioada de observare:	Sobolan maroniu <i>Rattus norvegicus</i>	Produs proaspăt, 0,005 m/m %	Consum de momeală: 43,4 % din totalul de alimente. Consum mediu de produs testat/probă de referință: 30,8 g/ 40,0 g. Mortalitate 100 %, la 7-11 zile de la expunere.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22




max. 20 zile.				Eficacitate 100 %.
Metoda de referință: Struhar, V. (2004 August) Studiu in laborator Studiu de palatabilitate/ eficacitate: 10 animale (5 femele și 5 masculi) testate. Aclimatizare: 6 zile Expunere: 4 zile Perioada de observare: max. 20 zile.	Sobolan maroniu <i>Rattus norvegicus</i>	Produs proaspăt, 0,005 m/m %		Consum de momeală: 48,2 % din totalul de alimente. Consum mediu de produs testat/probă de referință: 32,8 g/ 35,4 g. Mortalitate 100 %, la 7-10 zile de la expunere.
Metoda de referință: Wade JO.,(1997) Studiu de eficacitate: Testare pe teren în U.K. Locația aleasă este pe o exploatație agricolă, o magazie de grâu, unde s-a observat infestarea cu șobolani de casă. <u>Perioada pre-tratament:</u> - estimarea populației de rozătoare; - colectarea datelor privind palatabilitatea produsului Vertox Pellet, față de momeala netratată. -Stațiile de intoxicare (54) sunt plasate în zona infestată de rozătoare, fiecare conținând 30 g grâu uscat. - Stațiile de urmărire, de mărime, 15,0 cm*10,5 cm, cu nisip,	Șoareci de casă -- resistenți la warfarină (<i>Mus musculus</i>)	Produs proaspăt: 0,005 m/m % Infestare estimată: -aprox. 133 șoareci, cu alimentație alternativă la dispoziție		Eficacitate 100 %. Eficacitate bazată pe momeală consumată: 96,7 %. Eficacitate bazată pe scorul de urmărire: 96,0%. Momeală otrăvită consumată în prima săptămână: -429 g. Expunerea este oprită, când: -consumul de momeală otrăvită, este 3 g/ stații de intoxicare; -nu se înregistrează consum de momeală timp de 3 zile.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



	<p>așezate în diferite locuri. Perioada de testare: 52 zile Perioada de expunere: 31 zile (6 impulsuri) Perioada de post-tratament: 3 zile</p>			
Rodenticida	<p>Metoda de referință: Capel-Williams G., (2005) Studiu de eficacitate: Testare pe teren în Surrey, U.K. Locația aleasă este o cameră într-o fermă, unde s-a observat infestarea cu șoareci de casă. Perioada de otrăvire: -Stațiile de intoxicare (8) sunt plasate în zona infestată de rozătoare, -Stațiile de urmărire (5), cu mărimi de 14,75 cm*10,5 cm, cu nisip, așezate în diferite locuri. Perioada de testare: 28 zile. Perioada de expunere: 7 zile Perioada de post-tratament: 4 zile</p>	Șoareci de casă (<i>Mus musculus</i>)	Produs proaspăt: 0,005 m/m %	<p>Eficacitate bazată pe momeala consumată: 100 %. Eficacitate bazată pe scorul de urmărire: 100 %. 5 șoareci morți pe parcursul testării. Momeala otrăvită consumată: - 41 g în prima noapte de expunere, - crescând în primele două zile, după care scade până la zero în a 7-a zi de expunere. Scorul de urmărire: -scade treptat de la 14(în primele două zile), până la zero, la 6 zile după expunere. Pe perioada post-tratamentului nu s-a înregistrat nicio activitate (stații de intoxicare/stații de urmărire).</p>
	<p>Metoda de referință: Wade JO.,(1997)</p>	Șobolan maroniu (<i>Rattus</i>)	Produs proaspăt: 0,005 m/m %	Eficacitate bazată pe momeala



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonle, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



<p>Studiu de eficacitate: Testare pe teren în Shropshire, U.K. Locația aleasă este o exploatare agricolă, unde s-a observat infestarea cu șobolan maroniu. Perioada de otrăvire: -Stațiile de intoxicare (41) sunt plasate în zona infestată de rozătoare, fiecare conținând 50 g grâu uscat -Stațiile de urmărire (12), de mărime 15,0 cm*10,5 cm, cu nisip, așezate în diferite locuri. Perioada de testare: 38 zile. Perioada de expunere: 16 zile Perioada post-tratament: 4 zile</p>	<p><i>norvegicus</i>) rezistent la warfarină</p>	<p>Infestare estimată: -aprox. 90 șobolani, cu alimentație alternativă la dispoziție</p>	<p>consumată: 97,8 %. Eficacitate bazată pe scorul de urmărire: 96,7% Momeala otrăvită consumată: <u>Săptămâna I-a</u> - 732 g în prima zi de expunere (din 29 stații de intoxicare). <u>Săptămâna II-a</u> - 397 g în prima zi de expunere, - 67 g în a 10-a zi de expunere (din 4 stații de intoxicare), după care consumul a încetat. Se constată un nivel foarte ridicat de control, asupra șobolanilor, rezistenți la warfarină, după numai 11 zile de expunere.</p>
<p>Metoda de referință: Capel-Williams G., (2008) Studiu de eficacitate: Testare pe teren în Berkshire, U.K. Locația aleasă este o fermă, unde s-a observat infestarea cu șobolani. Perioada de otrăvire -Stațiile de intoxicare (14) sunt plasate în zona infestată de</p>	<p>Șobolan maroniu (<i>Rattus norvegicus</i>)</p>	<p>Produs proaspăt: 0,005 m/m %</p>	<p>Eficacitate bazată pe momeala consumată: 100 %. Eficacitate bazată pe scorul de urmărire: 91,7% Momeala otrăvită consumată: - 114 g în prima noapte, crescând până la 295 g în a 4-a noapte.</p>



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



	rozătoare, fiecare conținând 70 g grâu uscat -Stații de urmărire de mărime 24 cm*20 cm, cu nisip, așezate în diferite locuri. Perioada de testare: 34 zile. Perioada de expunere: 13 zile Perioada post-tratament: 4 zile			- consumul scade după a 4-a zi, ajungând la zero, în ziua a 13-a de expunere. Scorul de urmărire: -scade de la 15 (în ziua 15), până la zero (în ziua 27). Infestare eliminată foarte repede, consumul de momeală încetează după numai 13 zi de expunere.
--	---	--	--	--

XIV. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

Manipulare:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN347).

În timpul utilizării produsului nu se mănâcă, nu se bea și nu se fumează.

Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale.

Indicații: Se folosește pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor în locuințe, grajduri și clădiri agricole, grădini, depozite de deșeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. Instrucțiuni de utilizare:

Șoareci de casă (*Mus musculus*)

Infestație înaltă

5 până la 20 g de momeală în stații de intoxicare la fiecare 2 metri

Infestație scăzută

5 până la 20 g momeală în stații de intoxicare la fiecare 5 metri

Timpe de acțiune: Între zilele 4-10 de la ingerare

Șobolani maroniu (*Rattus norvegicus*)

Infestație înaltă 10 până la 60 g momeală în stații de intoxicare la fiecare 5 metri

Infestație scăzută

10 până la 60 g momeală în stații de intoxicare la fiecare 10 metri

Timpe de acțiune: Între zilele 4-10 de la ingerare

Restricții: Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite.

Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare.


A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.

O momeală pelet de grâu gata de utilizare pe bază de anticoagulant - Brodifacum (0,0025% w/w),



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



pentru a fi utilizată ca rodenticid pentru controlul șobolanilor- Șobolan cenușiu *Rattus norvegicus* și șoarecilor de casă *Mus musculus* - în interior, în aer liber în jurul clădirilor, de către Publicul general, Profesioniști și Profesioniști instruiți. Aplicarea momealii - direct în stațiile de momeală inviolabile.

Doze recomandate: Pentru șoareci, utilizați 5 - 20 g de momeală în stațiile de intoxicare, așezate la o distanță de 5 m (la distanță de 2 m în zonele cu infestări mari) în zonele în care șoarecii sunt activi.

Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul acesteia s-a oprit. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă (de exemplu, urme proaspete sau fecale). Șoarecii sunt foarte curioși și pot fi de folos programului de control ca momeala să fie mutată la fiecare 2-3 zile în momentul în care punctele de momeală sunt inspectate sau completate. Faceți inspecții frecvente ale punctelor de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost avariata de apă sau contaminată de murdărie. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu măriți dimensiunea punctului de momeală.

Înlocuiți orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie. Stațiile de intoxicare trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de intoxicare sunt intacte și pentru a elimina cadavrele rozătoarelor. Reaplicați momeala când este necesar.

Pentru șobolani, utilizați 10-60g de momeală în stațiile de intoxicare inviolabile, așezate la o distanță de 10 m (la distanță de 5 m în zonele cu infestări mari) în zonele în care șobolanii sunt activi.

Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul acesteia s-a oprit. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă (de exemplu, urme proaspete sau fecale). Nu mișcați sau deranjați punctele de momeală timp de mai multe zile după plasarea momealii. Dacă nu se observă semne de activitate a șobolanilor în apropierea momealii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare a șobolanilor.

Stațiile de intoxicare trebuie vizitate numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de intoxicare sunt intacte și pentru a elimina cadavrele rozătoarelor. Reaplicați momeala când este necesar.

Statutul de rezistență al populației țintă ar trebui luat în evidență atunci când se ia în considerare alegerea rodenticidului care trebuie utilizat. În zonele în care există suspiciuni de rezistență la anumite ingrediente active, evitați utilizarea acestora. Pentru a controla răspândirea rezistenței, se recomandă alternarea momelilor care conțin diferite ingrediente active anticoagulante.

Nu utilizați acest produs pentru momirea permanentă sau prin impulsuri.


Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de intoxicare la sfârșitul perioadei de tratament.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacității până la sfârșitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor. Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare între aplicări. Atunci când introduceți stațiile de intoxicare în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momealii cu apa. Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de intoxicare în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Nu aplicați acest produs direct în vizuine.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Profesioniști instruiți: Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici la nivel național. Dacă este folosită pentru tratament de momeală prin impulsuri: Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. Colectați orice momeală vărsată și rozătoarele moarte. Frecvența vizitelor la zona tratată trebuie să fie la discreția operatorului, în lumina anchetei efectuate la începutul tratamentului. Această frecvență ar trebui să fie în concordanță cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant. Nu utilizați acest produs pentru momeli permanente. Produsele nu trebuie utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului. Nu rotiți utilizarea diferitelor anticoagulante cu o potență comparabilă sau mai slabă în ceea ce privește gestionarea rezistenței. Pentru utilizarea în rotație, luați în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.

Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare sau vasele folosite în punctele de momeală protejate și protejate între aplicații. Atunci când introduceți stațiile de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa.

În vizuină: 10-60g de momeală pe vizuină. Momeala trebuie să se plaseze astfel încât să se minimizeze expunerea la speciile nevizate și la copii. Acoperiți sau blocați intrările vizuinilor pentru a reduce riscul respingerii și contaminării momelii. Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant. Efectuați o verificare înainte de începerea tratamentului al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării. Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Momire prin impulsuri: Pentru utilizarea în exterior, punctele de momire trebuie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Instrucțiuni specifice: Momeală în pliculețe: Nu deschideți plicurile care conțin momeala. Peleți - granule neambalate, boabe: Așezați momeala în punctul de momire folosind un dispozitiv de dozare. Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de intoxicare în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Înlocuiți orice momeală din punctele de momire în care momeala a fost avariata de apă sau contaminată de murdărie. Produsele nu trebuie utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului. Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de intoxicare la sfârșitul perioadei de tratament. Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau monitorizarea activităților rozătoarelor. Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare sau vasele folosite în punctele de momeală protejate și protejate între aplicații. Atunci când se plasează punctele de momeală în apropierea suprafețelor de apă (de exemplu, râuri, iazuri, canale de apă, diguri, șanțuri de irigare) sau sisteme de drenaj, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa. Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza. Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Efectuați o verificare înainte de începerea tratamentului al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonle, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariatul tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



probabilă și amploarea infestării. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeurii alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat. Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control. Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, acoperiți găuri, eliminați cât mai mult posibil potențialele alimente și băuturi) pentru a îmbunătăți consumul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinfestare. Stațiile de intoxicare/punctele de momire ar trebui plasate în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost observată anterior (de ex., căi de călătorie, locații de cuibărit, gropi de furaje, găuri, vizuini etc.). Unde este posibil, stațiile de intoxicare trebuie fixate de sol sau de alte structuri. Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. Colectați orice momeală vărsată și rozătoarele moarte. Urmați instrucțiunile specifice furnizate de codul de bune practici aplicabil la nivel național. Dacă absorbția momealei este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în alte locații și posibilitatea de a trece la o altă formulare a momelei. Utilizare profesională instruită: Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă. Nu rotiți utilizarea diferitelor anticoagulante cu o potență comparabilă sau mai slabă în ceea ce privește gestionarea rezistenței. Pentru utilizarea în rotație, luați în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic. Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare sau vasele folosite în punctele de momeală protejate între aplicații.

Perioada de valabilitate: 24 luni, în condiții normale. Păstrați recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.

Alte informații: Datorită modului lor de acțiune întârziat, poate dura între 4 și 10 zile pentru ca rodenticidele anticoagulante să fie eficiente după consumarea momelei.

XV. INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale; În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona - vitamina K1- este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp.

Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.

Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați vomă. Consultați medicul imediat.

Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare.

Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu



multă apă și se va consulta un medic.

Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Observații pentru medic; tratați simptomatic

XVI. MĂSURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Măsuri în caz de dispersie accidentală.

În cazul deversărilor în apa, nu lasați să patrundă în apele de suprafață.

Metode de decontaminare

Stațiile și punctele de momeala sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul soarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul sobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momealii folosiți mănuși de protecție.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesională, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor.

- Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariata de apă sau contaminată de murdărie.

- Scoateți produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament (cu excepția cazului în care este aplicat direct în vizuină).

Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momealii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul.

Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare.

Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată

Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mutați sau deschideți”; „conține un rodenticid”;

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonie, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală.

Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinvenire.

Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (numai pentru pachetele de plicuri, nu momeală liberă). Stațiile de momeală ar trebui amplasate în imediata vecinătate, unde a fost observată activitatea rozătoarelor.

Unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri.

Nu amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apa.

Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală.

XVIII. INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile).

Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

XIX. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE : Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumină directă a soarelui.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni.

XX. ALTE INFORMATII : Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4 - 10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant.

Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid și anume:



MINISTERIUL SĂNĂTĂȚII- COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. nu se pun suporturile de momeala in apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra in contact cu apa.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

